LABORATORIO PEDIATRICO

TOMA DE MUESTRA DE SALIVA PARA CORTISOL SALIVAL

MATERIAL: uno o dos tubos plásticos estériles (solicitar en el laboratorio)

INDICACIONES:

1- Se puede obtener la muestra a las 8.00 hs ó a las 23 hs, según indicación médica.
2- Mantenga un ayuno de 3 horas como mínimo.
3- No tome café, té ni mate 8 horas antes de la recolección de saliva.
4- No realice ejercicios físicos 12 horas antes de la recolección de saliva, en especial respetando un reposo de 2 hs. antes de la recolección de la muestra.
5- Realice 3 ó 4 enjuagues bucales con agua, 10 minutos antes de la recolección de la muestra, sin cepillarse los dientes.
6- Asegúrese que no haya sangrado de encías. (esto invalida la determinación de Cortisol en saliva).
7- Recolecte la muestra de saliva en el recipiente entregado por el laboratorio.
8- Remita la muestra de inmediato al Laboratorio, si no fuera posible, manténgala en la heladera no más de 12 horas.
9- Informar la administración de Corticoides por cualquier vía en los últimos 3 meses. Comentar el horario de la última administración si fue dentro de las 24 hs previas.

POR FAVOR, IDENTIFIQUE EL TUBO CON NOMBRE Y APELLIDO